

新型コロナワクチン 今わかっていること まだわからないこと

2021年2月17日
日本プライマリ・ケア連合学会
オンラインセミナー

名古屋検疫所
中部空港検疫所支所
検疫衛生課
空港検疫医療管理官
(医師)

守屋章成

1

自己紹介

1998年医師免許取得

家庭医として各地の診療所で勤務

2007年ごろからワクチン、渡航医学に
注力

2017年中部空港検疫所に転職

2020年元日～コロナ真っ最中

※ Financialおよびacademic COIなし

※ すべて個人の見解であり、検疫所、
厚生労働省および日本プライマリ・
ケア連合学会を代表するものではあ
りません

新型コロナワクチン対象者別検討

目次 [非表示]	
1	このページの
1.1	内容
1.2	参照先
2	高齢者
2.1	高齢者
2.2	高齢者
2.2.1	
3	小児
3.1	小児
3.2	小児
4	妊婦
4.1	妊婦
4.2	妊婦
5	妊婦等を兼
5.1	妊婦等
5.2	妊婦等

目次 [非表示]	
新型コロナワクチンまとめ (医療従事者向け)	
1	本ページおよび管理者について
2	おことわり
2.1	更新履歴
3	要点と個人的見解
4	開発が進む新型コロナワクチン
4.1	日本で接種される可能性が高いワクチン
4.2	米国と英国では既に認可済み
5	ワクチンの効果「vaccine efficacy」とは、「接種しなかったので感染した人数」から「接種し たけど感染した人数」への「割引率」
6	3ワクチンの製造について
6.1	mRNAワクチンとは
6.2	ウイルスベクターワクチンとは
6.3	ウイルスの遺伝子を体内に注入することに理論的な危険性はない
6.4	その他の新型コロナワクチン候補の製造
7	3ワクチンの治験 phase 3 論文と、そのインパクト
8	3ワクチン論文のかんたんまとめ

新型コロナワクチンまとめページ公開中

2

2

最初に結論

【接種を受ける側として】

高い効果を期待して、安心して受けてよい

1万分の1未満の確率で未知の有害事象が生ずる可能性には心構えを

私は、受けます。早く受けたい！

【接種を提供する側として】

高い効果があることを理解する

副反応はワクチンとしての通常範囲であることを理解する

アナフィラキシーには万全に備える

筋注の手技を再確認する

未知の要素があることを理解する

確率で考えることを理解する

接種に疑問や不安を抱く人と適切にコミュニケーションする

3

3

本日の流れ すべての職種の方にわかりやすく

1. ウイルスと免疫のしくみ
2. 新型コロナワクチンのしくみ
3. 新型コロナワクチンの効果
4. 新型コロナワクチンの副反応
5. 新型コロナワクチンの具体的な接種法
6. 新型コロナワクチンについてまだわからないこと
7. 新型コロナワクチンについての不安やデマ
8. 新型コロナワクチンみんなで気を付けること


4

4

1. ウイルスと免疫のしくみ

5

ウイルスのしくみ



① 殻 (から)

- エンベロープ

② トゲ

- スパイク蛋白等
- ヒト細胞侵入時のリガンド

③ 遺伝子


- RNAまたはDNA
- コロナウイルスは1本鎖プラス鎖RNA

遺伝子とは、ウイルス全体をつくるための
レシピ本

6

6

ウイルスのしくみ




1. ウイルスは**トゲ**でヒト細胞にくっつく
 2. ヒト細胞はうっかり侵入を許す
 3. ウイルスは細胞内にウイルス遺伝子=**レシピ本を放出**
 4. ウイルスレシピ本を読んだヒト細胞は自動的にウイルスの**コピーを大量生産**
 5. 食材を使い果たしてヒト細胞は**破壊**
 6. ウイルスは**次のヒト細胞**を狙いに
- 新型コロナウイルスは**のどや肺の細胞を破壊**する

7

7

免疫のしくみ 抗体とは



ウイルスに感染
→トゲのかたちに合った**抗体**を産生
同じウイルスが再度侵入
→**抗体がトゲに付着**し細胞侵入を阻止
= 「**免疫が付いた**」

抗体以外にも免疫のしくみは複雑多岐

- 液性免疫
 - 抗体のこと
- 細胞性免疫
 - 新型コロナmRNAワクチンは細胞性免疫も獲得
- 自然免疫

8

8

2. 新型コロナウイルスワクチンのしくみ

9

新型コロナウイルスワクチンのしくみ トゲさえあれば免疫が付く

感染の危険を冒さず免疫を付けるには？
→トゲを作ればいい；どうやって？

不活化ワクチン

- **バラバラ**にしたウイルス；トゲを含む
- ウイルスの**大量培養**が必要
- **新型コロナ**で治験第3相が現在数種類

生ワクチン（弱毒生ワクチン）

- **偶然弱**くなったウイルス；トゲがある
- **偶然に頼る**のでいつできるかわからない
- **新型コロナ**の効果的な弱毒株は未確立

ウイルスのトゲ

バラバラにしたウイルス


(弱毒)生ワクチン

毒性が弱いウイルス

10

10

新型コロナウイルスワクチンのしくみ トゲはヒト自身につくらせよう



ヒトの手でトゲをつくれないうら
ヒトの細胞につくらせればいいじゃん！

ヒト細胞はレシピがあれば何でもつくる
・感染ウイルスを大量生産してしまうほど

ウイルスレシピ本から
トゲのレシピのページだけコピー
→ワクチンに入れる

コピーそのまま
= mRNAワクチン

別のウイルスのレシピ本にはさむ
= ウイルスベクターワクチン

11

11

3. 新型コロナウイルスワクチンの効果

12

12

日本で使う新型コロナワクチン3種



ファイザー社製 (米国)

- ▶ ファイザー社とピオンテック社の共同開発
- ▶ mRNAワクチン
- ✓2021/2/14 特例承認
「コミナティ筋注」



モデルナ社製 (米国)

- ▶ モデルナ社と国立アレルギー感染症研究所の共同開発
- ▶ mRNAワクチン





アストラゼネカ社製 (英国)

- ▶ アストラゼネカ社とオックスフォード大学の共同開発
- ▶ ウイルスペクターワクチン

13

13

新型コロナワクチンの効果 そもそもワクチンの効果とは



治験はランダム化比較試験 (RCT)

- 真薬 (本物のワクチン) vs 偽薬 (プラセボ)

真薬群での感染率 vs 偽薬群での感染率

真薬群で10人中1人感染 vs
偽薬群で10人中5人感染

- 偽薬群が真薬を接種すれば5人中4人は防げた

「真薬ならば防げた割合」が
ワクチンの効果 (VE)


- $4/5=0.8$; ワクチンの効果80%

- または
 $(5/10 - 1/10) \div (5/10) = 0.8$; **80%**

14

14

新型コロナワクチンの効果 新型コロナ「発症」の予防



15

15

新型コロナワクチンの効果 より詳しく

	Pfizer	moderna	AstraZeneca
Overall	95.0% (90.0-97.9)	94.1% (89.3-96.8)	70.4% (54.8-80.6)
合併症あり	95.3% (87.7-98.8)	90.9% (74.7-96.7)	—
≥65歳すべて	—	86.4% (61.4-95.2)	—
≥65 合併症なし	100.0% (29.0-100)	—	—
≥65 合併症あり	91.7% (44.2-99.8)	—	—
重症化	88.9% (20.1-99.7)	100.0%	算出不能
1低用量→2標準量	—	—	90.0% (67.4-97.0)
1標準量→2標準量	—	—	62.1% (41.0-75.7)
無症候性感染	—	—	27.3% (-17.2-54.9)

16

16

新型コロナワクチンの効果 本音トーク

「発症」および「重症化」の予防効果が非常に高い

- 「無症候性感染（無症状病原体保有）」の予防効果は未検証or効果なし

まさか1年でこれほどの効果のワクチンが開発されるとは

- 理由1...mRNA/ウイルスベクターワクチンという新製法
- 理由2...開発国（治験国）での未曾有の大流行

17


17

4. 新型コロナワクチンの副反応

18

18

新型コロナワクチンの副反応 ワクチンとしての一般的な副反応



19

19

新型コロナワクチンの副反応 一般的な副反応への医学的対応

接種からの期間	症状	医学的対応
1週間以内	局所：接種部位の腫れ、痛み等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自制内なら経過観察 ・ 強ければ診察、治療
	全身：発熱、倦怠感等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新型コロナ、他疾患との鑑別を丁寧に評価 ・ 解熱剤の事前処方を現時点ではお勧めしない <ul style="list-style-type: none"> ・ 副反応と判断したら解熱剤服用可
1週間～1ヶ月	症状の内容を問わない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 未知の副反応、新型コロナ発症、他疾患すべての可能性を丁寧に評価 ・ 未知の副反応が否定できなければPMDA報告
1ヶ月後以降	症状の内容を問わない	<ul style="list-style-type: none"> ・ ワクチンとの関係は基本的でない <ul style="list-style-type: none"> ・ ワクチンへの生体反応は通常1ヶ月以内 ・ 新型コロナ、他疾患を丁寧に評価 ・ 未知の副反応が否定できなければPMDA報告

20

20

新型コロナウイルスワクチンの副反応 アナフィラキシー（強いアレルギー）



100万人中
11~17人

ほとんどが接種後15分以内

moderna

100万人中
2.5人

ほとんどが接種後15分以内

AstraZeneca

100万人中
9人

ほとんどが接種後15分以内

ワクチン全般

NSAIDs（鎮痛薬）

抗菌薬（抗生物質）

100万人中

100万人中

100万人中

1.3人 doi:10.1016/j.jaci.2015.07.048

1,000人

doi:10.1016/j.jaip.2018.06.010

300-4,000人

他のワクチンよりは多めだが、頻用薬よりはずっと低い

21

21

アナフィラキシーとアレルギー既往

既往		共通する 添加剤	対応
アナフィラキシー	新型コロナウイルス 1回目	—	• 2回目接種は 禁忌
	他のワクチン, 薬剤, 食物	あり	• 接種は 禁忌
	他のワクチン	なし	• 未知の機序 によるアナフィラキシーのリスクを 充分説明 • 接種する場合はアナフィラキシーへの 万全な備え を
	他の薬剤, 食物	なし	• アナフィラキシー 既往がない場合と同程度の注意 で接種 • アナフィラキシーへの備えは常に
アナフィラキシーではない アレルギー；花粉症etc		なし	• アレルギー 既往がない場合と同程度の注意 で接種 • アナフィラキシーへの備えは常に

22

22

ファイザー「コミナティ筋注」添加剤

添付文書上の記載	種別	備考
2- [(ポリエチレングリコール)-2000]-N,N-ジテトラデシルアセトアミド	ポリエチレングリコール (PEG)	アナフィラキシー原因物質 doi:10.1016/j.jaip.2020.09.029
[(4-ヒドロキシブチル)アザンジイル]ビス(ヘキサン-6,1-ジイル)ビス(2-ヘキシルデカン酸エステル)	薬剤添加剤	ワクチン・薬剤のアナフィラキシー既往では、当該薬剤の添加剤と照合が必要
1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン	薬剤添加剤	
コレステロール	生体内物質	
精製白糖	ショ糖；砂糖の主成分	
塩化ナトリウム	食塩；生体内物質	アナフィラキシー原因物質としてほぼあり得ない
塩化カリウム	生体内物質	
リン酸水素ナトリウム二水和物	食品添加物	
リン酸二水素カリウム	食品添加物	

23


23

5. 具体的な接種法

24

24

具体的な接種法 三角筋への筋肉注射です！




25

25

ファイザー「コミナティ」の薬液調整


保管 → 解凍 → 希釈分注 → 接種



26

26

効果/安全性が未検証の人口集団への接種をどうすべきか



妊婦
妊活中女性
授乳婦
小児
免疫抑制状態
悪性腫瘍
超高齢者 etc...


接種の是非

感染（発症）リスク・重症化リスク
↓
未知の有害事象リスク
その他の不利益のリスク

27

27

妊娠，妊活中女性，授乳中の接種



少なくとも mRNA ワクチンには、妊娠、妊活中女性、授乳中の児への**理論的リスクはない**
◦ ウイルスベクターワクチンも理論的リスクはないはずだが...

紛れ込み（偶発の悪化等）の際に「結びつけて考えてしまう」心のリスク

- 特に妊娠；流産・先天異常の自然発生
- 本人やパートナーがよくても周囲の親族は？

妊活中女性は接種後の妊活を一時中断する？

- 4週間？中断しない？

授乳中女性は接種後の授乳を一時中断する？


- 母子ストレスリスク？乳腺炎リスク？期間は？

主治医＋接種担当医師に納得いくまで相談して決断するしかない

28

28

免疫低下状態，悪性腫瘍での接種



少なくともmRNAワクチンには，免疫抑制状態への**理論的リスクはない**

- ウイルスベクターワクチンも理論的リスクはないはずだが...

十分な免疫獲得がされないリスク

- 免疫抑制はワクチンへの反応も抑制する


発熱等の副反応が**QOLを低下させる**リスク

主治医＋接種担当医師に納得いくまで相談して決断するしかない

29

29

超高齢者への接種



治験に高齢者も参加したが，**超高齢者は少なくサブ解析も行われていない**

十分な免疫獲得がされないリスク

- 高齢者は一般にワクチンへの免疫応答が低下する

発熱等の副反応が**QOLを低下させる**リスク


- 発熱，筋肉痛で寝たきりに...
- 若年者以上に鑑別疾患が多岐かつ困難

主治医＋接種担当医師に納得いくまで相談して決断するしかない

30

30

小児への接種



小児は発症リスクが低く、重症化リスクはさらに低い

小児から成人・高齢者への感染伝播リスクも低い可能性


効果と安全性が未検証で、感染・伝播リスクが低いなら、**小児に急いで接種する理由に乏しい**

- 必要な集団に接種が行き渡り、小児での効果と安全性が証明された後でも、遅くない

31

31

1→2回目は必ず同じメーカーの製剤



一般に、スケジュール途中で異なるメーカーの製剤を接種するべきではない

- どうしてもやむを得ない場合のみ、仕方がなく異なるメーカー製剤を接種する
- 異なるメーカー製剤間での**互換性 interchangeability**を検証したエビデンスはない


新型コロナワクチンも同様

- 1→2回目とも**同じメーカー製剤**になるよう厳しくコントロールすべき

32

32

1→2回目の間隔が規定と異なる場合



- ⊘ 規定の接種間隔よりも短い
 - 免疫が十分に付かないので**絶対禁忌**
- ✓ 規定の接種間隔どおり
 - 規定の接種間隔どおりがベスト
- ⚠ 規定の接種間隔よりも長い
 - 免疫は十分に付くが、1回目から**4週間程度**でいったん免疫がゼロになる
 - 1回目の4週間後～2回目接種までの間は**感染リスクが高くなる**

33


33

6. まだわからないこと

34

34

まだわからないこと 長期的な効果は未確定




接種3-4ヶ月後以降の実薬群は…

- 引き続き感染者数の増加は低いまま？
- どこかのタイミングで次第にor急激に増加＝効果減弱？

35

35

まだわからないこと 他人にうつさなくなるのか不明



「発症を予防する」ということは…

- 他人にもうつさないで済むぐらいにウイルス増殖を阻止する？
- 他人にはうつしてしまうが自分は発症しない程度の増殖阻止？

36

36

まだわからないこと 変異株に対する予防効果は未確定

変異系統			
B.1.1.7系統	接種者20人で中和反応が既知株と 同等 <ul style="list-style-type: none"> DOI:10.1101/2021.01.18.426984 接種者23人で中和抗体が 3.85倍低下 <ul style="list-style-type: none"> DOI:10.1101/2021.01.19.21249840 	中和反応が既知株と 同等 <ul style="list-style-type: none"> DOI:10.1101/2021.01.25.427948 	現時点で検証 公表なし
B.1.351系統		中和反応が 6.4倍低下 <ul style="list-style-type: none"> DOI:10.1101/2021.01.25.427948 	
501Y.V2系統		接種者16人で有意に 低下 <ul style="list-style-type: none"> DOI:10.1101/2021.01.15.426911 	
N501Y変異	接種者20人で中和反応が既知変異と 同等 <ul style="list-style-type: none"> DOI:10.1101/2021.01.07.425740 		

たとえ真の感染予防効果に変異株に対して減弱するとしても、
接種しない理由にはならない

37


37

7. 不安やデマ

38

38

新型コロナウイルスワクチンについてのデマ 「ウイルス遺伝子が自分の遺伝子に！」



- コロナワクチン中のウイルス遺伝子はどう逆立ちしてもヒトの遺伝子には組み込まれない…「セントラルドグマ」
- ワクチンはレシピ本の一部をコピーしただけ；コピーが他の本に勝手に入ってページの一部になることはあり得ない
- レシピ本のコピー（mRNA）は不安定；数分～数日以内に分解

39

39

新型コロナウイルスワクチンについての不安 「未知の重い副反応が今後発見される」



moderna



各治験で実薬を
接種された人数

約1万9千人

約1万5千人

約1万2千人

- 仮に未知の重い副反応が今後発見されるとしても、単純計算では実薬群の人数による確率よりも低いはず ≈ **おおむね10,000分の1未満**か
- 厚生労働省抗体調査2021年1月：コロナ感染率0.91% ≈ **100分の1/約1年**
- **接種して1ヶ月以内の10,000分の1未満の未知の重大副反応** vs **未接種で1年あたり100分の1 = 1ヶ月あたり1,200分の1**のコロナ感染
- 有害事象**10,000分の1未満** vs コロナ感染**1,200分の1**…**どっちを選ぶ？**

40

40

8. みんなで気を付けること

41

41

新型コロナウイルスについて みんなで気を付けること

2回接種が済んでも感染対策は変わらず継続

- ・接種完了したからと家族外会食やカラオケや人混みへの旅行はしない

どうしても接種の不安が拭えない人に圧力や無理強いをしない

- ・知識の伝達と十分なコミュニケーションをしたら、待つ
- ・未だ証明されていない集団免疫を理由に接種を迫るのは、科学的に不誠実

接種しないまま感染してしまう人を責めない

- ・どんな理由・事情があっても、感染した人を責めるのは絶対ダメ

進学、就職、結婚等に際して接種を条件付けない、差別しない

- ・「将来必要になるかもしれませんよ」と誘導するのは医療職による差別の助長

重篤有害事象のマスコミ報道に振り回されない

- ・「有害事象＝後で起きただけ」と「副反応＝因果関係あり」を冷静に区別する

42

42

おわりに

43

43

もう一度結論

【接種を受ける側として】

高い効果を期待して、安心して受けてよい
1万分の1未満の確率で未知の有害事象が生ずる可能性には心構えを

私は、受けます。早く受けたい！

【接種を提供する側として】

高い効果があることを理解する

副反応はワクチンとしての通常範囲であることを理解する

アナフィラキシーには万全に備える

筋注の手技を再確認する

未知の要素があることを理解する

確率で考えることを理解する

接種に疑問や不安を抱く人と適切にコミュニケーションする

44

44

より詳しいまとめ URLご紹介

新型コロナワクチンまとめ（医療従事者向け）



<https://cutt.ly/lkEvnbQ>

新型コロナワクチン対象者別検討



<https://cutt.ly/fkExiXL>